

## Состав и форма выпуска

Жидкость для инъекций слегка желтоватая, прозрачная; допускается легкая опалесценция, наличие мелкой кристаллической и тканевой взвеси.

*Действующее вещество:* 1 ампула содержит 2 мл жидкости, которую получают из замороженного стекловидного тела глаз разных видов убойного скота (крупного рогатого скота, свиней, коз).

## Фармакологическое действие

Препарат имеет биостимулирующее действие, ускоряет процессы регенерации тканей, способствует улучшению процессов обмена, имеет стимулирующее влияние на образование костной мозоли. Имеет неспецифическое десенсибилизирующее и обезболивающее действие при невралгиях, фантомной боли, радикулитах и других заболеваниях периферической нервной системы, сопровождающейся болевым синдромом. Смягчает рубцовую ткань и способствует ее рассасыванию.

## Фармакокинетика

Не изучалась.

## Показания к применению

- полиневрит, радикулит, невралгия, фантомная боль;
- профилактика избыточного разрастания соединительной ткани в раннем послеоперационном периоде;
- лечение ожоговых, послеоперационных, келоидных и другого происхождения рубцов;
- контрактура суставов;
- для ускорения образования костной мозоли при переломах.

## Режим дозирования

Вводят п/к по 2 мл ежедневно. Курс лечения при невралгиях - 8-10 дней, при рубцах, контрактурах и переломах - до 25 дней.

Повторение курса лечения рекомендуется через один месяц или позднее.

Продолжительность курса лечения определяется индивидуально.

## Побочные действия

Возможны аллергические реакции в виде усиления боли и воспаления в области введения; крапивница, зуд, сыпь, гиперемия кожи, эритема, анафилактические реакции.

## Противопоказания к применению

- инфекционные заболевания;
- острые воспалительные процессы;
- кахексия;
- нефрит;
- нефросклероз;
- цирроз печени;
- сердечная недостаточность II и III стадии;
- онкологические заболевания;
- беременность и период лактации;
- детский возраст до 18 лет.

## Применение при беременности и кормлении грудью

Опыта применения лекарственного средства у беременных и женщин в период кормления грудью нет, поэтому не следует применять данный препарат в эти периоды.

## Особые указания

С осторожностью препарат назначают пациентам с отягощенным аллергоанамнезом.

*Влияние на способность к управлению автотранспортом и другими потенциально опасными механизмами*

Не установлено.

## Передозировка

До настоящего времени явления передозировки при применении стекловидного тела не описаны.

## Лекарственное взаимодействие

Не отмечено негативных явлений при применении препарата одновременно с другими лекарственными средствами.

## Условия хранения препарата

Препарат хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Не

замораживать.

## **Срок годности препарата**

2 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия отпуска из аптек**

Препарат отпускается по рецепту.